

KONTAKT:



**Klinični oddelek za otroško,
mladostniško in razvojno nevrologijo**

Pediatrična klinika

Univerzitetni klinični center

Bohoričeva 20

1525 Ljubljana

Slovenija

Telefon: 01 522 92 72 ali 01 522 92 49


Faks: 01 522 40 70

E-pošta: pednevro@kclj.si

www: <http://pednevro.pedkl.si>

PREKINJANJE EPILEPTIČNIH NAPADOV S STESOLIDOM

Navodila za starše in vzgojitelje



PRVA POMOČ PRI EPILEPTIČNEM NAPADU

- 1. Otroka umaknite na varno** (stran od vode, ognja, elektrike, višine), da preprečite dodatne poškodbe.
- 2. Položite ga na bok**, v položaj za nezavestnega. Ničesar mu ne tlačite v usta.
- 3. Če napad traja dlje kot 3 minute**, uporabite zdravilo Stesolid 5 ali 10 mg (kot je predpisal zdravnik).
- 4. Če napad kljub zdravilu vztraja še 2 minuti**, čim prej odidite do najbližje zdravstvene ustanove ali pokličite nujno medicinsko pomoč – **112!**







Če ima _____ napad,
(ime in priimek otroka)

prosim, pokličite _____
(ime in priimek starša)

na tel. številko _____ .

KAKO UPORABITI STESOLID PRI OTROKU S KRČI?

- 1. Otroka položite na desni bok** in mu pokrčite kolena.
- 2. Odstranite pokrovček z rektiole** in konico namažite s hladilnim mazilom ali vazelinom.
- 3. Otroku nežno vstavite rektiole v zadnjično odprtino** in jo potisnite skozi do začetka širšega dela (če je otrok mlajši od 3 let, le do polovice).
- 4. Rektiole med iztiskanjem zdravila držite čim bolj pokončno.** Popolnoma iztisnite vsebino rektiole.
- 5. Rektiole počasi izvlecite** in jo tudi med izvlečenjem stiskajte, da se zdravilo ne vrne v rektiole.
- 6. Otroku nato še nekaj časa stiskajte zadnjico**, da preprečite iztekanje zdravila.



Opozorilo!

Preverjajte rok uporabnosti zdravila Stesolid.
Zdravilo shranjujte na temperaturi do 25°C.

